



W badaniu podaje się doustnie środek cieniujący - siarczan barytu. Związek ten posiada właściwości pochłaniania promieniowania rentgenowskiego. Następnie wykonuje się zdjęcia rentgenowskie, które są praktycznie „odlewem „ kształtu zakontrastowanego przewodu pokarmowego.

### **Na badanie należy zgłosić się ze skierowaniem od lekarza!!!**

Przed wykonaniem badania RTG przelyku, żołądka i dwunastnicy należy zastosować się do poniższych zaleceń.

- W dniu badania należy pozostawać **na czczo** - nie jeść i nie pić minimum 6 godzin – Ostatni posiłek najlepiej spożyć najpóźniej ok. godz 19-tej dnia poprzedzającego badanie.
- Przed wykonaniem badania nie wolno palić papierosów ani żuć gumy. W dniu poprzedzającym badanie **nie należy** spożywać pokarmów ciężkostrawnych, wzdymających oraz napojów gazowanych.
- Pacjenci chorzy na cukrzycę są diagnozowani w pierwszej kolejności aby mogli przyjąć leki i spożyć posiłek po badaniu.

### **Leki**

- Doustne leki przyjmowane na stałe należy przyjąć po badaniu.

### **Niezbędne informacje przekazywane lekarzowi**

- Pacjent powinien dostarczyć dokumentację wcześniej wykonanych badań obrazowych i karty informacyjne ze wcześniejszego leczenia .

### **Przeciwwskazania**

- Cięża