



Urografia jest to rodzaj badania obrazowego, które pozwala na uwidocznienie nerek i dróg odprowadzających mocz. Podczas badania pacjentowi podaje się do naczyń krwionośnych środek cieniujący, który następnie jest wydalany przez nerki i pozwala na zobrazowanie kolejno kielichów i miedniczek nerkowych, moczowodów i pęcherza moczowego.

Na badanie należy zgłosić się ze skierowaniem od lekarza!!!

Przed wykonaniem badania UROGRAFII należy zastosować się do poniższych zaleceń.

1. Na 2-3 dni przed badaniem :

- Wykonać badanie krwi na poziom kreatyniny (w Laboratorium) (**na czczo !!!**)

- zacząć zażywać **Espumisan** lub **Esputicon** 3 razy dziennie po 2 kapsułki. Oba te leki mają dokładnie takie samo działanie, odgazowują i można je bez recepty nabyć w każdej aptece.

2. W dniu poprzedzającym badanie należy:

- nie spożywać pokarmów ciężkostrawnych, wzdymających oraz napojów gazowanych - ostatni posiłek zjeść nie później niż o 18 -tej /płynny/ dnia poprzedzającego badania.

3. W dniu badania należy:

- wypić od ½ do 1 litra niegazowanej wody

- zażyć rano 2 kaps. Esputiconu lub Espumisanu

- na badanie zgłosić się **na czczo**

- zadbać o wypróżnienie

- nie palić papierosów i nie pić kawy

- pacjenci, którym badanie wyznaczono po godzinie 14-tej **nie mogą jeść na 6 godzin przed planowaną godziną badania** – płyny wolno spożywać.

- jeżeli wcześniej były wykonywane badania USG **należy przynieść ze sobą ich wynik**

Uwaga !

1. Prosimy o bezwzględnie o poinformowanie lekarza kierującego i personelu pracowni Rtg o uczuleniu na środki kontrastowe, alergiach, lub schorzeniach nerek zwłaszcza, gdy wynik nadania klirensu kreatyniny GFR jest poniżej 30 ml / min.

2. Pacjentki w ciąży powinny bezwzględnie powiadomić o tym personel pracowni Rtg.

3. Pacjent powinien pamiętać, aby w czasie badania poinformować, o nagłych dolegliwościach.

4. Pacjenci przyjmujący preparaty metforminy / metformax, siofor, glucophage, avamina, formetic/ powinni zaprzestać jej przyjmowanie na 48 godzin przed planowanym badaniem i na 24 godziny po badaniu – zmianę leczenia na okres badania uzgodnić ze swoim lekarzem.

5. Bezwzględny przeciwwskazaniem do wykonania badania jest pierwszy trymestr ciąży I.

Drugi i trzeci trymestr ciąży są przeciwwskazaniem względnym – w zależności od wskazań medycznych .

U kobiet w okresie rozrodczym zalecane jest wykonywanie badań radiologicznych w pierwszej fazie cyklu miesięczkowego – bezpośrednio po miesiączce , w razie wątpliwości pacjentka powinna wykonać test ciążowy.